

**ACHBT**ASSOCIATION DE CHIRURGIE  
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE  
ET TRANSPLANTATION[www.achbt.org](http://www.achbt.org)

## CLUB DE RECHERCHE CLINIQUE SYNOPSIS SUJET D'ETUDE

A transmettre par mail au leader du groupe correspondant (Foie, Pancréas, Voies biliaires, TH) et à [achbt@hopscotchcongres.com](mailto:achbt@hopscotchcongres.com)

### THEMATIQUE :

**PANCREAS** ([sebastien.gaujoux@gmail.com](mailto:sebastien.gaujoux@gmail.com))

Promoteur	CHU TOURS Service de Chirurgie Digestive, Endocrinienne, Oncologique et Transplantation Hépatique
Coordonnateur de l'étude	DR. PETRU BUCUR
Titre complet de la recherche	EVALUATION RETROSPECTIVE DES STRATEGIES DEVANT UNE ARTERE HEPATIQUE DROITE REMPLACEE LORS D'UNE DUODENOPANCREATECTOMIE POUR CANCER
Justification et pertinence de la recherche	<p>La présence d'une artère hépatique droite chez les patients qui sont opérés d'une duodéno pancréatectomie céphalique pour cancer pose un problème de gestion. Dans la littérature le peu de données disponibles laisse penser que la présence d'une artère hépatique droite s'associe avec un risque hémorragique plus important, un curage de moins bonne qualité, notamment si l'artère droite est au contact de la tumeur.</p> <p>Certaines équipes ont publié des résultats de séries de conservation de l'artère droite sans détérioration des résultats immédiats et à distance. Il existe quelques publications de faisabilité de la ligature de l'artère droite lors d'une duodéno pancréatectomie céphalique précédée ou non d'une embolisation préopératoire, mais qui n'évitent pas le risque d'abcès hépatique.</p> <p>Notre but est d'avoir une vue d'ensemble des pratiques en France et de comparer dans la mesure du possible les résultats des diverses stratégies.</p>
Objectif principal de l'étude	Apparition des complications ischémiques hépatiques immédiates et à distance
Objectifs secondaires de l'étude	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comparaison de la morbi-mortalité entre les diverses stratégies</li><li>• Comparaison du taux de R0 et nombre de ganglions entre les diverses stratégies</li><li>• Comparaison du taux de récurrence locale entre les diverses stratégies</li><li>• Impact sur la survie à distance des diverses stratégies</li></ul>
Type d'étude	Étude rétrospective, multicentrique



**ACHBT**

ASSOCIATION DE CHIRURGIE  
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE  
ET TRANSPLANTATION

[www.achbt.org](http://www.achbt.org)

<b>Population</b>	<b>Critères d'inclusion :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Age <math>\geq</math> 18 ans</li><li>• DPC pour cancer</li><li>• Artère droite connue en préopératoire</li><li>• Par cœlioscopie ou laparotomie</li></ul> <b>Critères d'exclusion :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Totalisation de la DPC pour aspect du pancréas</li><li>• AHD accessoire avec une artère droite autre visible dans le pédicule</li><li>• Résections combinées (foie, colon, intestin, autre)</li></ul>
<b>Durée de l'étude</b>	Tous les patients qui remplissent les critères d'inclusion et d'exclusion, opérés entre 01/01/2013 et 31/12/2022seront inclus.
<b>Déroulement de l'étude</b>	Le recueil rétrospectif des données des patients sera réalisé via un formulaire Excel