

**ACHBT**ASSOCIATION DE CHIRURGIE
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE
ET TRANSPLANTATIONwww.achbt.org

CLUB DE RECHERCHE CLINIQUE

SYNOPSIS SUJET D'ETUDE

A transmettre par mail au leader du groupe correspondant (Foie, Pancréas, Voies biliaires, TH) et à achbt@hopsotchcongres.com

THEMATIQUE :

- FOIE** (davidfuks80@gmail.com)
- PANCREAS** (sebastien.gaujoux@gmail.com)
- TRANSPLANTATION** (louisebarbier@hotmail.fr)
- VOIES BILIAIRES** (eg.chirurgie@gmail.com)

Promoteur	Montpellier
Coordonnateur de l'étude	Dr Astrid HERRERO encadrement de la thèse de Marie ALAUX.
Titre complet de la recherche	Sténoses biliaires bénignes opérées mimant un cholangiocarcinome péri-hilaire.
Justification et Pertinence de la recherche	<p>Le cholangiocarcinome péri hilaire nécessite une expertise pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge.</p> <p>Le diagnostic est retenu en présence d'un faisceau d'arguments (une analyse fine de l'imagerie, les marqueurs tumoraux et éventuellement l'histologie).</p> <p>Malgré les progrès de l'imagerie, la différenciation entre les pathologies bénignes et malignes du hile hépatique demeure difficile.</p> <p>Le diagnostic histologique pré opératoire n'est obtenu que dans la moitié des cas : en effet les brossages ont une sensibilité limitée malgré une bonne spécificité.</p> <p>L'unique traitement curatif actuel repose sur une chirurgie d'exérèse avec des marges saines.</p> <p>L'incidence des pathologies bénignes opérées mimant un cholangiocarcinome péri-hilaire varie de 3,1% à 17,3% dans la littérature. La plus fréquente est représentée par la cholangite à IgG4. Dans la pratique actuelle le dosage des IgG4 au cours du bilan pré opératoire n'est pas systématique dans les centres. Aucune étude française n'existe sur ce sujet. Pourtant il serait intéressant d'améliorer le bilan diagnostique de ces lésions afin de ne pas réaliser une chirurgie lourde et risquée à tort ; d'autant qu'il existe un traitement efficace par corticothérapie.</p>
Objectifs	<p>Primaire : déterminer l'incidence des patients présentant des sténoses biliaires bénignes opérées mimant un cholangiocarcinome péri hilaire. Observer leurs caractéristiques dans le but d'affiner le diagnostic pré opératoire.</p> <p>Secondaires : étudier la morbi-mortalité des hépatectomies chez ces patients ainsi que l'incidence de récurrence sous forme de cholangiocarcinome</p>
Type d'étude	Étude multicentrique rétrospective française.
Population	Patients de 18 ans ou plus opérés pour suspicion de cholangiocarcinome péri hilaire avec sur la pièce opératoire une sténose biliaire bénigne ; en France entre 2010 et 2023.
Calcul d'effectif / Taille de l'échantillon	Nombre de cas attendus : 20-50.



ACHBT

ASSOCIATION DE CHIRURGIE
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE
ET TRANSPLANTATION

www.achbt.org

Critères de jugement	Primaire : incidence des patients présentant des sténoses biliaires bénignes opérées mimant un cholangiocarcinome péri hilare. Secondaire : caractéristiques de ces patients.
Durée de l'étude	1 an.
Déroulement de l'étude	Analyse rétrospective.
Remarques	Les imageries au diagnostic seront envoyées (sous forme de CD) au centre référent de l'étude pour analyse et relecture. Le positionnement des auteurs dans l'article sera au prorata du nombre de malades inclus.